


1. Critères de référence
2. Infos à partager au patient

Sensibilisation de la communauté



3. Critères d'identification
4. Infos à partager au patient

5. Critères d'identification
6. Infos à partager au patient

1ère phase
4 à 9 jours après la consultation foraine

Tout le monde
2ème phase
-4 à 9 jours après retour à son domicile

Diagramme de l'organisation des activités du projet wound care¹

Critères de reference vers le centre de santé

- Plaie profonde
- Plaie large (Grand Diametre > 10cm)
- Plaie coule du pus
- Plaie avec gonflement
- Plaie sent mauvais
- Plaie saigne beaucoup
- Plaie localisée: visage , articulations etc
- Plaie avec fièvre(température > 37,5°c)
- Fatigue sévère, amaigrissement ou manque d'appétit
- Apparition d' asticots
- Apparition de ganglions
- Cas suspect : UB, Lèpre, Filariose L.

Conseils à donner à un patient ou à un garde-malade référé vers le centre de santé

- Faire la consultation au centre de santé
- Suivre rigoureusement le traitement de l'infirmier
- Respecter les rendez-vous au centre de santé
- Avoir une bonne hygiène corporelle
- Maintenir son pansement sec et propre

Critères d'identification des « cas SIMPLES » à gérer à domicile

- Plaie de petite taille (GD < 5cm)
- Plaie superficielle
- Plaie avec absence d'hémorragie
- Plaie propre, rouge, ne suinte pas
- Pas de signe de danger (fièvre, gonflement, mauvaise odeur, Élargissement de la plaie)
- Patient présente un bon état général (Absence de fatigue et d'amaigrissement)

Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à gérer à domicile

➤ **Garder la plaie toujours propre**

- Nettoyer à l'eau savonneuse (Kongui, Kabakrou, palmida, savon de marseille)
- Ou nettoyer avec tisane de "tchayo" / "amagnrin" tiède
- Utiliser un tissu propre et personnel pour nettoyer la plaie
- Nettoyer la plaie tous les jours si elle est sale
- Nettoyer la plaie tous les trois jours si elle est propre
- Appliquer du beurre de karité si la plaie est propre et si vous en avez

Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à gérer à domicile (suite)

- Aller au centre de santé si apparition de signe de danger:
 - ✓ Fièvre
 - ✓ gonflement
 - ✓ mauvaise odeur
 - ✓ saignement
 - ✓ Élargissement de la plaie
- Protéger la plaie contre les mouches, le sable, la poussière
- Utiliser une bande ou un tissu propre pour protéger la plaie
- Remplacer la bande ou le tissu lorsqu'il est mouillé

Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à gérer à domicile (suite)

- Après le bandage, assurez-vous que vous pouvez toujours bouger les articulations
- Mouiller le bandage au moment du retrait lorsque le bandage colle à la plaie

Conseils à donner à un patient « cas SIMPLES » à gérer à domicile (suite)

- **Ne pas** essayer d'assécher la plaie avec des poudres
- **Ne pas** utiliser savon en poudre, Détergents, Savon parfumé, Citron, Poudres (feuilles, écorces, coquilles d'escargot), Eau bouillante, Tisane bouillante, Sable, Gélules (Toupaye), Comprimé écrasé, Pommade (pénicilline...)

Critères d'identification des « cas SUSPECTS » à gérer à domicile

- Plaie pas trop grande: grand diamètre entre 5 cm et 10 cm, sans signe de danger
- Petite plaie sale sans signe de danger (fièvre, gonflement, mauvaise odeur, saignement, élargissement de la plaie)
- Patient présente un bon état général

Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS » à gérer à domicile

➤ **Garder la plaie toujours propre**

- Nettoyer à l'eau savonneuse (Kongui, Kabakrou, palmida, savon de marseille)
- Ou nettoyer avec tisane de "tchayo" / "amagnrin" tiède
- Utiliser un tissu propre et personnel pour nettoyer la plaie
- Nettoyer la plaie tous les jours si elle est sale
- Nettoyer la plaie tous les trois jours si elle est propre
- Appliquer du beurre de karité si la plaie est propre et si vous en avez
- **Mettre une couche épaisse de tissu propre et sec**

Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS » à gérer à domicile (suite)

- Aller au centre de santé si apparition de signe de danger:
 - ✓ Fièvre
 - ✓ gonflement
 - ✓ mauvaise odeur
 - ✓ saignement
 - ✓ Élargissement de la plaie
- Protéger la plaie contre les mouches, le sable, la poussière
- Utiliser une bande ou un tissu propre pour protéger la plaie
- Remplacer la bande ou le tissu lorsqu'il est mouillé

Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS » à gérer à domicile (suite)

- Après le bandage, assurez-vous que vous pouvez toujours bouger les articulations
- Mouiller le bandage au moment du retrait lorsque le bandage colle à la plaie

Conseils à donner à un patient « cas SUSPECTS » à gérer à domicile (suite)

- Ne pas essayer d'assécher la plaie avec des poudres
- Ne pas utiliser Savon en poudre, Détergents, Savon parfumé, Citron, Poudres (feuilles, écorces, coquilles d'escargot), Eau bouillante, Tisane bouillante, Sable, Gélules (Toupaye), Comprimé écrasé, Pommade (pénicilline...)