

GALE



Plan du cours

- Objectifs
- Généralités
- Diagnostic
- Traitement

Objectifs

- Reconnaître la gale
- Traiter le malade

Généralités

Maladie cutanée contagieuse causée par un *parasite: Sarcoptes scabiei hominis*

Transmission:

- **contact cutané direct**
- **Indirect:**
 - d'objets de toilette (éponge, serviette),
 - de vêtements
 - ou de la literie

Diagnostic

1) *Le prurit*

- Continu, diurne et nocturne, plus intense la nuit
- Souvent localisé au début aux espaces interdigitaux, il s'étend rapidement aux autres parties du corps

Diagnostic

2) **Les vésicules** des mains et pieds: enfant ++



3) **Les sillons** des mains et entre les doigts

4) **Les nodules scabieux**: sorte de boules rouges localisées aux OGE chez l'adulte et au niveau axillaire chez l'enfant



TRAITEMENT

3 volets:

1. Le traitement local

2. Le traitement oral

3. Le traitement anti-parasitaire de l'environnement

TRAITEMENT

1) Le traitement local

- application d'un produit anti-scabieux
- 2 principes actifs utilisés: **pyréthrianoïde de synthèse** (Sprégal®) et **benzoate de benzyle** (Ascabiol®)

NB:

- Rester en contact 24 heures: enfants et adultes
- 12 heures: nourrissons et femmes enceintes
- Prendre un bain à la fin du traitement



TRAITEMENT

2) Le traitement oral: *ivermectine* 3 mg (prise unique)

Ivermectine (Stromectol[®], Mectizan[®])

0,2mg/kg comprimés à 3mg

A partir de 15kg

Poids	Nombre de comprimés
15 – 25kg	1 comprimé
25 – 45kg	2 comprimés
Adulte	3 comprimés

-Traitement à **renouveler 10 à 15 jours** plus tard

-NB: associer un traitement local possible



TRAITEMENT

3) Le traitement anti-parasitaire de l'environnement

- Traitement antiparasitaire: draps, couvertures, linge de toilette, vêtements, chaussures...
- **type A-PAR[®] ou Phagoacaricide[®]** : à pulvériser sur les surfaces à traiter
- Laver à l'eau chaude et au savon et bien sécher les draps, couvertures, linge de toilette, vêtements, chaussures





Gale: à faire

- Bonne hygiène corporelle et des vêtements
- Respect rigoureux du traitement prescrit au malade et à ses proches
- Pas de relations sexuelles pendant tout le traitement
- Aller au centre de santé dès l'apparition des symptômes



Gale: à ne pas faire

- Aller à l'école ou au travail (contact avec d'autres personnes) avant la fin du traitement
- Partager les effets de toilettes
- Traiter uniquement le patient

**MERCI DE VOTRE AIMABLE
ATTENTION**